ARCHIOPACTUS BRUCHI HELLER = *ARCHIOPACTUS NIVEOPECTUS* HUST.

NOTA SINONIMICA

por

F. MONRÓS

Al revisar un lote de material coleccionado en la última semana de enero del corriente año en Añatuya (Provincia de Santiago del



Pareja de *Archiopactus bruchi* Heller, en cópula.

Estero), encuentro abundantemente representado un curculiónido que motiva la presente nota:

Heller, en los Anales de la Sociedad Científica Argentina, 91, año 1921, p. 23, fig. 2, describe *Archiopactus bruchi*.

Hustache, en los Anales del Museo Nacional de Buenos Aires, 34, año 1926, p. 160, describe *Archiopactus niveopectus*.

Durante mi permanencia en Añatuya, obtengo 48 ejemplares en cópula, de los cuales los ♂♂ corresponden invariablemente a la forma de Hustache y las ♀♀ a la de Heller.

Examinados los genitales de otros 31 individuos procedentes de la misma localidad, pero no en cópula, compruebo igualmente que los órganos masculinos pertenecen siempre a la presunta especie de Hustache y los femeninos a la de Heller.



Archiopactus bruchi Heller.
A la izquierda, macho (= *A. niveopectus* Hust.).
A la derecha, hembra.

Por lo tanto, y ante la evidencia de que se trata de una única especie, establezco la siguiente sinonimia:

Archiopactus bruchi Heller, 1921
= *Archiopactus niveopectus* Hustache, 1926.

A fin de disipar toda duda al respecto, acompaño figura semiesquemática de una pareja obtenida el día 25-1-1944 sobre vinal *(Pro-*

sopis ruscifolia) como también del macho y de la hembra de la especie en cuestión.

Este curculiónido parece ser muy común en Añatuya, donde lo encuentro en cantidad royendo los foliolos de algarrobo *(Prosopis nigra)* y con menor frecuencia sobre vinal y otras leguminosas de la región.

A la descripción del macho, puede agregarse que los ejemplares vivos están revestidos de escamas de color verde brillante que les dan un aspecto muy vistoso.

La hembra sin este hábito.

Abril de 1944.